

Meie puravikke 10

PRUUN SAMETPURAVIK

Xerocomus badius



Kübar kastanpruun, kumer kuni lame, sametjas, sile, kuiv või kleepuv-limane, läbimõõt kuni 8 cm. Torukesed hele- kuni väävelkollased, vajutamisel värvuvad kiiresti intensiivselt rohekas- kuni mustjassiniiseks, nõngusalt jalale külge kasvanud; poorid sama värvusega, võrdlemisi suured, nurgelised. Jalg helepruun, alusel määrdunudkollane, kiuline, teraliselt sametjas, alusel ahenev, kuni 10 x 1,5 cm. Seeneliha valge või kollakas, värvub pikema aja väljal (tundidega) murdekohtadel siniseks, maheda maitsega. Eospulber oliivpruun. Eosed käävjas-ellipsoidsed, 12–16 x 4–6 µm.

Okasmetsades, eriti männikutes, sageli VIII–XI. Söödav värskelt.

Sarnane liik: rohekas sametpuravik.



Xerocomus porosporus



Kübar oliivooker kuni -pruun, sageli punakate või rohekate laikudega, jämesametjas, kumer kuni lame, kuiv, vananedes kübaranhk lõhe- neb ruutjalt ja paljastab kollaka viljaliha, läbi- mõõt kuni 12 cm. Torukesed helekollased kuni oliivirohekad, vajutamisel värvuvad kiiresti sini- seks; poorid sama värvusega, suured ja nurgelised. Jalg määrdunudhall või pruunikas, tipp kollane, sageli punaka alaga, pikikiuline, üle- mine osa peenelt ebemeline, silinderjas, kuni 10 x 2 cm. Seeneliha kollakas, jala allosas puna- kas, murde- ja lõikekohtadel värvub algul sini- seks, hiljem veinpunaseks, maheda maitsega. Eospulber pruunikas. Eosed käävjas-ellipsoidsed, 12–15 x 4–6 µm.

Lehtmetsades, eriti tammikutes, väga harva. VIII–X. Söödav värskelt.


Sarnane liik: punajalg-sametpuravik.



- kupatatult söödav
- söödav
- tinglikult söödav
- mittesöödav
- Eesti punases raamatus ja/või riikliku looduskaitse all

- mürgine
- surmavalt mürgine
- värskelt mürgine, kupatatult söödav
- mürgisus kaheldav

Loe veel:



Xerocomus impolitus

Kübar kreemikas, kollakaspuruun kuni ookerpuruun, mõnikord oliivja tooniga, serv heledam, poolkerajas kuni lame, keskel nõgus, sametjas, kuiv, märja ilmaga kleepuv, nahk ei pragune, läbimõõt kuni 15 cm. Torukesed hele- kuni kuld-kollased, vananedes rohekaskollased, vajutamisel ei värvu siniseks; poorid sama värvusega, kinnituval nõgusalat või on vabad, väikesed, ümarad. Jalg valge kuni helekollane, mõnikord punakaspuruuni vööga, kiuline, tipus ebemeline, silinderjas või mõhkjas, juurduv, kuni 12 x 4 cm. Seeneliha valkas kuni sidrunkollane, lõikekohtadel värvub mõnikord sinakaks, jala alusel sageli joodi lõhnaga. Eospulber oliivpuruun. Eosed käävjas-ellipsoidsed, 11–15 x 5–6 µm.

Kasvab koos tammedega, lubjalembene liik. Väga harva. IX. Mittesöödav.

**PUNAJALG-SAMETPURAVIK**

Xerocomus chrysenteron

Sünoniüm *X. pascuus*

Viljakehad värvuvad katsumisel kohe hallikassiniseks.

Kübar oliiv-hallikaspuruun, tihti paiguti roosakas, lilla- kas või punakas (tigude näritud kohtades ja pragudes), noorelt tihesametjas, vanemalt praguneb nahk soomusjateks plaatideks, nõrgalt kleepuv, läbimõõt kuni 8 cm. Torukesed olivkollased kuni -pruunid, nõgusalat hambaga jalale külge kasvanud; poorid sama värvusega, vörlemisi suured, nurgelised. Jalg üleni või osaliselt (enamasti allpool) karmiinpunane kuni lillakasroosa, viltjas kuni peenesoomuseline, nõrgalt kleepuv, kuni 7 x 1 cm. Seeneliha kahvatukollakas, vahel roosakalaiguline, pehme, vatjas, nõrga puuviljalõhnaga. Eospulber oliivpuruun. Eosed käävjas-ellipsoidsed, 12–16 x 4–5 µm.

Laialehistes leht- ja segametsades, lubjalembene, sage Põhja- ja Lääne-Eestis, saartel. VIII-IX. Söödav värskelt.

Sarnane liik: *Xerocomus porosporus*.

***Xerocomus pruinatus***

Kübar mustjas- kuni purpurpuruun, serv sageli heleda roosaka või purpurese tooniga, iseloomulik oliivhallikas läige, kumer kuni lame, keskel nõgus, kuiv, märja ilmaga kleepuv, sametjas, servas nahk mõnikord praguneb, pragunemiskohad punakad, läbimõõt kuni 10 cm. Torukesed valkjad kuni sidrun- või rohekaskollased, vajutamisel värvuvad sinakaks, lühikesed; poorid sama värvusega, vanalt punakaspuruunid, väikesed, ümarad. Jalg kollakas, punakate laikudega, alusel oliivkollane, sile või tipus ebemeline, kuni 10 x 2 cm. Seeneliha kübaras helekollane, jalas tumedam kollane, mõnikord punakaspuruunide laikudega, lõikamisel värvub aeglaselt sinakaks. Eospulber sinepi-kollane. Eosed käävjas-ellipsoidsed, 11–15 x 4–5,5 µm.

Okas- ja segametsades. Väga harva. IX-X. Söödav värskelt.

