

Meie kärbseseeni 4

MALL VAASMA

RÖNGATA KÄRBSESEEN, tüüpteisend

*Amanita vaginata var. *vaginata**

Kübar helehall või pruunikashall, keskpaigas tumedam, serv laialt rihveljas, noorelt poolmunajas-koonusjas, hiljem lame, tihti laia lameda kühmuga, enamasti paljas, kuid harva laiade valkjate üldkatise ebemetega, nõrgalt kleepuv, läbimõõt kuni 12 cm.

Eoslehekesed valged, vabad, suhteliselt laiad. Jalg kübara värvusega, ent heledam, kiuline, peenehärmame või ebemeline, tihti hallidest soomustest kirju, kuiv, röngata, tupega, alusel veidi jämenev, mitte muguljas, kuni 15 x 1,5 x 2 cm. Tupp valkjas, avar, kotjas, ebaühtlaselt hõlmise servaga, paks, vatjas. Seeneliha valkjas, õhuke, maitseta, lõhnata. Eospulber valge. Eosed kerajad, pole amüloidised, 8,5–12 µm.

Okas-, leht- ja segametsades, väga sageli.

VII–XI.

Värskelt mürgine, kupatatult söödav, kuid halva kvaliteediga.

Sarnased liigid: oliivhall kärbseseen ja kollakaspruun kärbseseen.



RÖNGATA KÄRBSESEEN, valge teisend

*Amanita vaginata var. *alba**

Viljakeha valge, muudelt tunnustelt sarnaneb tüüp-teisendiga.

Segametsades, harva.

VIII–X.

Värskelt mürgine, kupatatult söödav, kuid sarnasuse tõttu väga mürgise valge kärbseseenega on parem korjamisest loobuda, sest oht liigid segi ajada on suur.

Sarnased liigid: valge kärbseseen ja kollase kärbseseene valge teisend.



kupatatult söödav

söödav

tinglikult söödav

mittesöödav

Eesti punases raamatus ja/või riikliku looduskaitse all


mürgine

surmavalt mürgine

värskelt mürgine,

käeldav

Loe veel:



KAHEVÄRVILINE KÄRBSESEEN

Amanita battarvae



Kübar pruunikashall, oliivhall või hallpruun, heledam rihveljas servaosa eraldatud keskosast silmatorkava tumeda ringjoonega, noorelt laikellukjas, hiljem lame kuni kergelt süvendunud, enamasti paljas, nõrgalt kleepuv, läbimõõt kuni 12 cm.

Eoslehekesed valged, vabad, serv mustjas või pruunikas, suhteliselt laiad ja tihedad. Jalg valkjas, kaetud hällide või hallikaspuruunide peente soomustega, röngata, tupega, kuni 15 x 2 cm. Tupp valkjas, roostepruuunide laikudega, avar, kotjas, paks. Seeneliha valkjas, õhuke, maitseta, lõhnata. Eospulber valge. Eosed kerajad, pole amüloidised, 10,5–16 µm.

Okasmetsades, sageli.

VIII–X.

Värskelt mürgine, kupatatult söödav.

Sarnased liigid: röngata kärbseseen ja kollakaspuruun kärbseseen.



KOLLAKASPRUUUN KÄRBSESEEN

Amanita fulva



Kübar kollakas- või punakaspuruun, keskpaigas tumepruun, serv rihveljas, laikellukjas kuni lame, mõnikord laiade punakaspuruunide üldkatise ebemetega, nõrgalt kleepuv, läbimõõt kuni 9 cm.

Eoslehekesed valged, vabad, suhteliselt laiad. Jalg valkjas või helepruunikas, kaetud vähemärgatavate peente soomustega, algul säsikas, hiljem torujas, röngata, tupega, kuni 13 x 1 cm. Tupp valkjas või pruunikas, tihti erepruunidé täppide või laikudega, avar, kotjas. Seeneliha valkjas, õhuke, maitseta, lõhnata. Eospulber valge. Eosed kerajad, pole amüloidised, 8–14 µm.

Leht- ja segametsades, väga sageli.

VIII–X.

Värskelt mürgine, kupatatult söödav.

Sarnased liigid: röngata kärbseseen ja oranž kärbseseen.



ORANŽ KÄRBSESEEN

Amanita crocea



Kübar hele oranžkollane kuni oranžpruun, mõnikord peaegu valkjas, serv rihveljas, noorelt laikellukjas, siis kumer ja lõpuks lame, kühmuga, paljas, nõrgalt limane, läbimõõt kuni 12 cm.

Eoslehekesed valged, vabad, suhteliselt laiad. Jalg valkjas, tihealt kaetud kollaste või oranžide soomustega, algul säsikas, hiljem torujas, röngata, tupega, kuni 17 x 2 cm. Tupp valge, tihti serv ja sisekülg kollakas või oranžikas, avar, kotjas. Seeneliha valkjas, õhuke, maitseta, lõhnata. Eospulber valge. Eosed kerajad, pole amüloidised, 9–14 µm.

Leht- ja okasmetsades, harva.

VIII–IX.

Värskelt mürgine, kupatatult söödav.

Sarnased liigid: kollakaspuruun kärbseseen ja nartsiss-kärbseseen.

