



KARID (1170): Väga mitmekesise elustikuga veealused kaljud, rahnud, aluspõhja- või moreenkõrgendikud.

REEFS: Underwater cliffs, boulders, bedrock or glacial till ridges with high biological diversity.

РИФЫ: Подводные скалы, валуны, выступы коренной породы или моренные холмы, характеризующиеся высоким биологическим разнообразием.





VEEALUSED LIIVAMADALAD (1110): Liivase põhjaga madalad merealad, mida asustavad iseloomulikud taimekooslused (merihein, määndvetikad) ja loomakooslused (settes elavad karbid).



SANDBANKS, slightly covered by sea water all the time: Shallow sandy bottom areas inhabited by specific flora (seagrass and charophytes) and fauna (clams).


ПЕСЧАНЫЕ ОТМЕЛИ, которые всегда слегка покрыты морской водой: Мелководные участки моря с песчаным дном и характерными флорой (морские водоросли и донные растения, харовые водоросли) и фауной (зарывающиеся моллюски).




MERIHEINA-AASAD: Mereelustiku mitmekesisusel ja produktiivsusel ning kliimamuutuste kontekstis ülioluline elupaik liivamadalatel. Siinse piirkonna võtmeliigiks on pikk merihein (*Zostera marina*), mis on meres hea süsinikusiduja.

SEAGRASS MEADOWS: Crucial part of the sandbanks habitat type. Eelgrass (*Zostera marina*) is a key seagrass species supporting biodiversity and productivity here. Eelgrass is also a major carbon sink in the marine environment.

МОРСКИЕ ЛУГА: Важнейшие места обитания на песчаных отмелях с точки зрения высокой продуктивности и в контексте изменения климата. Ключевой вид сообщества – взморник морской (*Zostera marina*) отличается высокой способностью связывать углерод, тем самым является важным его поглотителем в морской среде.



LAUGMADALIKUD (1140): Liivase, savise ja mudase põhjaga lauged pagurannad, mis ajuti mõõnaga või tuulte mõjul paljanduvad.



MUDFLATS AND SANDFLATS: Mudflats, clay- and sandflats not covered by seawater at low tide or due to winds.


ИЛИСТЫЕ И ПЕСЧАНЫЕ ОТМЕЛИ: Илистые и песчаные отмели, обнажающиеся во время отлива или под влиянием сгонных ветров.



LAIAD MADALAD LAHED (1160): Lainetuse eest üsna hästi kaitstud madalaveelised lahed ja abajad, kus domineerivad pehmed põhjasetted. Rikkaliku põhjaelustiku tõttu sobib see hästi lindudele toitumisealaks.

LARGE SHALLOW INLETS AND BAYS: Shallow bays, where soft seabed sediments prevail and are well protected against wave exposure. Due to rich benthic communities, these bays are important feeding areas for birds.

БОЛЬШИЕ МЕЛКОВОДНЫЕ МОРСКИЕ ЗАЛИВЫ И БУХТЫ: Мелководные заливы и бухты, хорошо защищённые от воздействия волн, где преобладают мягкие донные отложения. Благодаря богатым донным сообществам, эти заливы являются важными местами поиска пропитания птиц.



Fotod: Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Photos: Estonian Marine Institute, Tartu University
Фото: Эстонский морской институт Тартуского университета

Andmekaitse nõuetega tõttu pole näidatud levikut Soome vetes.
Due to data restrictions distribution is not shown in Finnish waters.
Ввиду требований защиты данных, распространение в водах Финляндии не показано.

