


Mehhiko Kiilkarp (*Rangia Cuneata*)

EESTI RANNIKUMERE VÕÖRLIIGID



▲ Joonis 1. Mehiko kiilkarbi erinevad vaated.

Joonis 2. Potentsiaalne levik Eesti rannikumeres.



Liigi kirjeldus: Mehiko kiilkarp on paksude ja tugevate (tuntavalt tugevam kui kohalikud karbid) enam-vähem ovaalse kujuga karbipoolmetega. Karbi värvus varieerub helepruunist hallikaspruunini. Karbi sisemus on valge ja sinakashall. Karbil on silmatorkavalt väljaulatuv ülemine osa ning täiskasvanud isendid on 2-4 cm pikkused (Joonis 1).

Levik: Liik on looduslikult pärit Mehiko lahest. Eestis ja Euroopas on tegemist võõrliigiga. Eestist leiti karp esmakordselt 2014. aastal Pärnust ja 2019. aastal Soome lahest (Joonis 2). Hetkel on liiki Pärnu lahes ja Saaremaa lõunarannikul mitmes kohas arvukalt levinud.

Elupaik ja ökoloogia: Karp elab peamiselt jõgede suudmealades ning mageveekogude mudases ja liivases põhjas ning ta suudab kergesti kohaneda erineva soolasisaldusega.

Mõjud kohalikule ökosüsteemile: Kuna mehiko kiilkarp on filtreerija, võib arvukas populatsioon parandada vee kvaliteeti. Karp võib olla ka toiduallikas kaladele ja lindudele, kuid hetkel selle kohta leiud puuduvad. Samas võib karp konkureerida kohaliku balti lamekarbiga, muutes kohaliku ökosüsteemi. Lisaks võivad nad tuua endaga kaasa uusi parasiite, kes mõjuvad kohalikele liikidele laastavalt.

Kas olete näinud Eestis Mehiko kiilkarpi?

Palun teavitage
oma vaatlustest siin:



<https://arcegis/1CC1011>

Kuidas hinnata võõrliikide ja teistest inimtegevustest tulevaid mõjusid kohalikule loodusele?

Tutvu võõrliikide mõjude hindamise tööriistaga (NEAT) ja ka teiste mereplaneerimist ja majandamist abistavate tööriistadega (PlanWise4Blue, ABC-planner, etc.) siin:



<https://gis.sea.ee/bluebiosites/>

