

S2BI_EE

Originaalmõõdiku nimetus	<i>Screening to Brief Intervention</i>
Originaalmõõdiku akronüüm	S2BI
Mõõtevahendi nimetus eesti keeles	Uimastite tarvitamise sõeltest noorukitele
Akronüüm, siinses kultuuriruumis kasutamiseks	S2BI_EE
Viide originaalmõõdikule	<p>Levy, S. J., Kokotailo, P. K., & Committee on Substance Abuse. (2011). Substance use screening, brief intervention, and referral to treatment for pediatricians. <i>Pediatrics</i>, 128(5), e1330-e1340. doi: 10.1542/peds.2011-1754</p> <p>Levy, S., & Shrier, L. (2015). Adolescent SBIRT: Toolkit for providers. Screening, brief intervention, referral for treatment for alcohol and other drug use. Boston Children's Hospital.</p>
Originaali loomise aasta	2011
Kui originaalmõõdik loodud Eestis, siis originaali looja nimi, e-post	-
Viide kohandatud mõõtevahendi psühhomeetristele näitajatele	Haring, L., Anni, K., Kaur, K., Alapert, A., ja Aluoja, A. (2025). Sõltuvushäirete olemasolu ja raskusastme hindamise mõõtevahendite kohandamine Eestis kasutamiseks. Uuringu raport.
Mõõtevahendi adapteerimise aasta	2025
Mõõdikuga seotud võtmesõnad	S2BI, sõelküsimumstik, noorukid, uimastite kuritarvitamine, alkohol, tubakas, kanep, kannabinoidid, retseptiravimid, stimulandid, inhalandid, psühhoaktiivsed ained

Mõõtevahendi tüüp	Adapteeritud mõõdik
Mõõdiku kasutamise eesmärk	Võimaldab tuvastada uimastite tarvitamise häire riski 12–17 aastastel noortel, et määratleda (lüh)sekkumise vajadust.
Mõõtevahendi kirjeldus	S2BI on sõelküsimumstik noorukitele, mis võimaldab hinnata uimastite tarvitamise häire riski. Sõelküsimumstikuga kaardistatakse uimastite tarvitamise määr viimase aasta jooksul tubakatoodete, alkoholi ja kannabinoidide osas ning vajadusel ka mittemeditsiinilisel eesmärgil tarvitatud retseptiravimite, stimulantide, inhalantide ja muude psühhoaktiivsete ainete osas.
Mõõdiku alaosad (faktorid, alaskaalad)	Alaosad puuduvad
Mõõtevahendis kasutatav keel	- eesti keel
Tõlkeprotsessi nõuetekohasus	- Jah
Mõõtevahendi formaat	- Paber-pliiats versioon - Elektroonne versioon

Mõõdiku täitja	<ul style="list-style-type: none"> - Isik täidab enesekohase mõõdiku - Isik täidab mõõdiku tervishoiutöötaja, juhtumikorraldaja, lähedase, tugiisiku, kaasabil <p>* Käesoleva uuring käigus täitsid uuritavad mõõtevahendi iseseisvalt või tervishoiutöötaja kaasabil</p>
Sihtrühm vanuse lõikes (adapteerimisuuringus osalenud isikud)	12–17 aastased noorukid
Hinnangu andmise aluseks olev ajavahemik	Viimane aasta
Kui sageli ja mis etappides soovitatakse mõõdikut kasutada (sh vastavalt kirjanduse andmetele)	Test on loodud kasutamiseks sõeltestina, et tuvastada uimastitarvitamise häire esinemise riskitasemed ja edasise sekkumise või hindamise vajadus.
Pädevusnõuded mõõtevahendit kasutavale spetsialistile	Puuduvad.
Mõõtevahendi kasutamise väljaõppe eeldus	Mõõdiku kasutamise väljaõppe eeldus puudub. Soovituslik on mõõtevahendit tutvustava koolituse läbimine.
Mõõdikus olevate küsimuste / väidete arv	Seitse küsimust, aga kui esimese kolme puhul vastatakse "Mitte kunagi", siis viimasele neljale küsimusele vastama ei pea.
Hindamisaste	<ul style="list-style-type: none"> - Vaimse tervise astmelise abi baastase - Vaimse tervise astmelise abi I aste - Vaimse tervise astmelise abi II aste - Vaimse tervise astmelise abi III aste - Vaimse tervise astmelise abi IV aste
Mõõdiku täitmiseks kuluv aeg (sh vastavalt kirjanduse andmetele)	2–5 minutit
Mõõtevahendi kasutamise juhend	Juhend on lisatud mõõdiku päisesse; küsimustikku on võimalik täita enesekohase instrumendina või spetsialisti poolt läbiviiduna intervjuu vormis.
Skoorimise juhend	Igale küsimusele antakse hinnang tarvitamise sageduse kohta viimase aasta jooksul skaalal 1 – 4 („Mitte kordagi“, „Üks-kaks korda“, „Iga kuu“, „Iga nädal või sagedamini“). Kui esimesele kolmele küsimusele vastatakse „Mitte kordagi“, siis võib testi edasise tegemise katkestada. Saadud skooride põhjal hinnatakse uimastitarvitamise häire esinemise riskitasemeid erinevate ainete lõikes.
Skooride tõlgendamine	<p>“Mitte kordagi” - risk uimastitarvitamise häire esinemiseks puudub.</p> <p>“Üks-kaks korda” - madal risk häire tekkimiseks või esinemiseks.</p> <p>“Iga kuu” - risk häire kujunemiseks või esinemiseks on keskmine.</p> <p>“Iga nädal” - risk häire kujunemiseks või esinemiseks on kõrge.</p>

Tagasiside andmine uuritavale	Kui risk puudub, siis soovitatakse pakkuda uuritavale tuge ja tunnustust uimastite tarvitamise mitte alustamiseks. Madala riski puhul soovitatakse uuritavale jagada lühidalt informatsiooni tarvitamisega kaasnevatest terviseriskidest. Keskmise riski puhul soovitatakse teha motiveeriv lühinõustamine. Kõrge riski puhul soovitatakse motiveerida uuritavat pöörduma edasisele nõustamisele ja/või ravile.
Manuaali olemasolu originaalmõõdikul	- Ei
Manuaali olemasolu adapteeritud mõõdikul	- Ei
Lisadokumentatsiooni olemasolu	- Mõõdiku kasutamise juhend
Litsentsi omandamise vajadus	- Ei Mõõdik on avalikus omandis, intellektuaalse omandi kaitset mõõtevahendi kasutamisel ei kohaldata. Mõõtevahend on kasutatav tasuta, kuid eeldatakse korrektset viitamist originaalartiklile, kui olukord seda nõuab.
Info litsentsi tasu kohta	- Ei kuulu kohaldamisele
Kui on olemas litsentsitasu, nimetada tasu suurus (sh aastaarv, millal info on tuvastatud)	- Ei kuulu kohaldamisele
Info litsentsi hoidja kohta (sh aastaarv, millal info on tuvastatud)	- Ei kuulu kohaldamisele

Hinnatud psühhomeetriselised näitajad:	Valideerimise tase		
	Jah	Ei	Ei ole kohaldatav
Tõlke teostus vastavalt nõuetele	+		
Reliaablus			
Sisereliaablus			+
Kordustestimise reliaablus		+	
Hindajate vaheline reliaablus		+	
Valiidsus			
Konstruktivaliidsus	+		
Konvergentne valiidsus	+		
Prognoosiv valiidsus			+
Eristav valiidsus (<i>discriminant validity</i>)	+		
Diagnostiline tõhusus			+
Sensitiivsus			+
Spetsiifilisus			+
Äralõikepunktide piirid			+
Normide vajalikkus			+
Normide olemasolu		+	